

HARNSTEINE KATZE

KLEINTIERPRAXEN

Leipzig-Schönefeld Leipzig-Mockau

Beraten

Untersuchen

Heilen

Tierärzte

- Dr. Volker Jähnig
Fachtierarzt für Kleintiere
ZB Zier-, Zoo- und Wildvögel
- TÄ Kerstin Tärre
- TÄ Nadine Hagendorf
- Dr. Juliane Prell



Tierphysiotherapeutin

- Mandy Liebner, TFA

Zugelassene Weiterbildungsstätte zur Ausbildung
zum **Fachtierarzt für Kleintiere**

Schönefeld
Mockau

0341- 2300800
0341-60050600

www.tierpraxis-leipzig.de

FLUTD = Feline Lower Urinary Tract Disease

Harnsteine Katze - Woher?

- Ursache: unklar! Harn enthält Mineralien, die Kristalle und Steine bilden können
- häufig Katzen zwischen 2 und 6 Jahren
- Risikofaktoren: Wohnungskatze, erhöhtes Körpergewicht, Trockenfutter, geringe Wasseraufnahme, Mehrkatzenhaushalte, Langhaarkatzen
- sehr jung kastrierte Kater besonders gefährdet

Harnsteine Katze – Symptome?

- kein Harn (lebensbedrohlicher Notfall!) oder nur tropfenweise bei deutlichem Harndrang
- Bauch hochgradig schmerzhaft
- Apathie, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall

Harnsteine Katze - Was tun?

- **Behandlung:**
bei Verschluss der Harnröhre bitte umgehend Vorstellung der Katze beim Tierarzt - Lebensgefahr! - intensive Behandlung in der Praxis notwendig
- **Prophylaxe:**
 - Stressreduktion im Wohnbereich (Katzentoilette, Katzenstreu, Futter- und Wassernapf für jede Katze gut und in Ruhe zugänglich; eigener „hochwertiger“ Ruheplatz; keine Änderung der Gewohnheiten)
 - diätetische Maßnahmen (Harnsteinverminderndes Feuchtfutter; viel Flüssigkeit, evtl. verdünnte Katzenmilch oder Fleischbrühe; harnansäuernde Zusatzfuttermittel wie z.B. Uro-Pet)
 - Medikamente (Pheromone; Glykosaminoglykane; Amitriptylin)

Ihre Katze sollte nach einer akuten Erkrankung neben der Fütterung mit einer Spezialdiät regelmäßig alle 3 Monate auf Kristalle im Harn untersucht werden.