ORCHIDOPEXIE
(Hodenverlagerung)



TAGESKLINIK FÜR KLEINTIERE
Dr. Volker Jähnig – Dr. Patrick Jähnig

Dr. Volker Jähnig
Fachtierarzt für Kleintiere, ZB für Zier-, Zoo- und Wildvögel
Dr. Susanne Troll
Fachtierärztin für Zootiere, ZB für Zier-, Zoo- und Wildvögel
TÄ Nadine Hagendorf
Fachtierärztin für Klein- und Heimtiere
Dr. Charlotte Arz
Dr. Patrick Jähnig
TÄ Eva Martel
TÄ Anna Kühne
TÄ Kerstin Tärre
TÄ Bettina Kern
TA Daniel Eisenhuth-Hänel

Leipzig-Schönefeld
Waldbaurstraße 2 b
04347 Leipzig
Tel.: 0341 23 00 800

Leipzig-Mockau
Kieler Straße 25
04357 Leipzig
Tel.: 0341 600 50 600

www.tierpraxis-leipzig.de

ORCHIDOPEXIE
(Hodenverlagerung)

Sind die Hoden nach der 8. Lebenswoche nicht im Hodensack fühlbar, liegt ein Kryptochismus, d. h. ein unvollständiger Hodenabstieg vor. Er kann ein- oder beidseitig auftreten. Der Hoden kann sowohl in der Leiste (inguinal) oder sogar noch im Bauch (abdominal) zu finden sein.
Da diese Erkrankung erblich übertragen wird, sollten Tiere mit einem Kryptorchismus nicht zur Zucht verwendet werden. Wir bieten dafür die Sterilisation an.
Eine gesunde Hormonproduktion von Testosteron hat eine Reihe positiver Wirkungen auf die Entwicklung männlicher Tiere: nicht nur der männliche Habitus und das Sexualverhalten werden durch Testosteron gesteuert, auch die Entwicklung von Knochen, Gelenken, Bändern, Sehnen und Muskeln wird durch Testosteron angeregt. Inzwischen ist bekannt, dass Kreuzbandrisse bei jung kastrierten Rüden Jahre eher auftreten als bei unkastrierten Tieren.

Wenn Sie sich für die Orchidopexie Ihres Lieblings entschieden haben, wird Ihr Tier bei uns in einer Sitzung operiert.

Nach dem Abholen sollten Sie unbedingt auf folgendes Achten:
- Am Tag der OP kein Futter. Steht der Hund wieder, kann er vorsichtig Wasser angeboten bekommen. Mit der Fütterung wird am nächsten Morgen in kleinen Schritten begonnen.
- Bitte Lecken unbedingt verhindern. Der Rüde leckt sich mit der rauhen Zunge die Bakterien direkt in die frische Naht.
- Bei Schwellungen vorsichtig 3 x täglich 10 min Kühlen.
- Die Fäden am Abdomen und in der Leiste können nach 8 bis 10 Tagen entfernt werden.
- Am Hodensack wurde ein Tupfer als Leckschutz aufgeknotet. Sollte dieser stören, einfach abschneiden. Der Faden ist darunter mehrmals verknotet. Den Faden bitte erst nach 14 bis 16 Tagen entfernen. Er besteht zwar aus resorbierbarem Material, sollte aber trotzdem entfernt werden, um eine Infektion zu verhindern. An dieser Stelle ist der Hoden dann mit dem Hodensack fixiert, was bei einem gesunden Hoden nicht der Fall ist.
- Sie erhalten von uns für eine Woche ein Antibiotikum und auch ein Mittel gegen Entzündungen/Schmerzen. Bitte geben Sie diese Medikamente genau nach der auf der Tüte beschriebenen Dosierung.
- Bei Blutungen, plötzlichen Schmerzen, Fieber, Inappetenz konsultieren Sie bitte Ihren Haustierarzt – bei Fragen stehen wir Ihnen und Ihrem Haustierarzt gern zur Verfügung.

Trotz langjähriger Erfahrung und großer Sorgfalt unseres OP-Teams kann es nach 3 bis 4 Wochen durch eine eingeschränkte Durchblutung zum Absterben des Hodens kommen. Er wird dann kleiner und härter, muss aber nicht entfernt werden, da keine Gefahr der Tumorbildung besteht. Bitte konsultieren Sie uns in diesem Fall.